Hématologie - Oncologie
CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier universitaire mère-enfant
Université de Montréal

ALGORITHME AF DOULEUR

Score initial : _____
Numérique 0-10
Visage FPS-R
FLACC

Acétaminophène
Ibuprofène
Dose initiale fentanyl IN
Heure : _____
Maxilène aux 2 mains et aux 2 plis du coude

15 minutes

Évaluation médicale
Heure : _____

Score : _____
Numérique 0-10
Visage FPS-R
FLACC

Si douleur < 3/10 :
- Congé 1h post dose de fentanyl selon réévaluation et bilan

Si diminution du score de douleur mais douleur toujours > ou = 3/10 :
- RR et saturométrie aux heures
- Morphine OU hydromorphone si intolérance à la morphine

Si douleur inchangée ou augmentée :
- RR et saturométrie aux heures
- Traitement IV
- Se référer à la FOPRHO-1726-Anémie falciforme-admission pour douleur, fièvre ou STA

60 minutes post dose de fentanyl IN

Évaluation nursing
Heure : _____

Score : _____
Numérique 0-10
Visage FPS-R
FLACC

Si douleur < 5/10 :
- Congé 1h selon réévaluation et bilan

Si diminution du score de douleur mais douleur toujours > ou = 5/10 :
- RR et saturométrie aux heures
- Entredose de morphine OU hydromorphone si intolérance à la morphine

Si douleur inchangée ou augmentée :
- RR et saturométrie aux heures
- Traitement IV
- Se référer à la FOPRHO-1726-Anémie falciforme-admission pour douleur, fièvre ou STA

120 minutes post dose de fentanyl IN

Évaluation nursing
Heure : _____

Score : _____
Numérique 0-10
Visage FPS-R
FLACC

Si douleur < 5/10 :
- Congé 1h selon réévaluation et bilan

Si douleur > ou = 5/10 :
- Aviser médecin et installer soluté
- Traitement IV
- Se référer à la FOPRHO-1726-Anémie falciforme-admission pour douleur, fièvre ou STA

Mise à jour: 2025-01-20